



ترکیبات شیمیایی و فعالیت‌های بیولوژیکی ژل رویال

آیدا سادات صدرالدینی. غلامعلی نهضتی پاقلعه*. فاطمه غازیانی

گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

دريافت: مرداد ۱۳۹۴؛ پذيرش: فروردین ۱۳۹۵

پست الکترونيک نويسنده پاسخگو: aida.sadredini@ut.ac.ir

چکیده

ژل رویال ماده‌ای غلیظ و کرم رنگ است که از غدد غذاساز زنبورعسل تولید می‌شود. ژل رویال شامل مخلوطی از آب، قندها، چربی، پروتئین‌ها، اسید اmine‌های آزاد پرولین و لیزین، برخی آنزیم‌ها از جمله گلوکز اکسیداز، فسفاتاز و کولین استراز، بیوپترین (Biopterine) و نشوپترین (Neopterine) (پروتئین‌هایی با نقش کوآنزیمی)، ۱۰ هیدورکسی ۲-۲-دستوئیک اسید است. ژل رویال به دلیل کاربردهای زیادی که در پزشکی و دارویی دارد، امروزه در دنیا به عنوان یک محصول تجاری مطرح است.

واژه‌های کلیدی: زنبورعسل، ژل رویال، آنزیم، پروتئین، لیزید

مقدمه

ترش خاص (pH برابر $4/5 - ۳/۴$)، و دارای چگالی تقریبی $۱/۱$ گرم بر سانتی متر مکعب، و اندکی در آب محلول است [۱].

ترکیبات ژل رویال

ژل رویال شامل طیف گسترده‌ای از ترکیبات شیمیایی می‌باشد از قبیل:

۱- پروتئین‌ها: $۱۷-۴۵$ درصد وزن خشک ($۹-۱۸$ درصد وزن تر) ژل رویال را تشکیل می‌دهد. حدود ۶۰ درصد پروتئین‌های آن محلول در آب می‌باشد. همچنین ژل رویال از پروتئین‌ها و پپتیدهایی با عملکردهای مختلفی از جمله پپتیدهایی با فعالیت‌های آنتی باکتریال و ضد قارچی تشکیل شده است [۱].

پپتیدهای ضد میکروبی موجود در ژل رویال

رویالیسین^۱: دارای اثرات ضد باکتریایی قوی بر علیه باکتری‌های گرم مثبت است در حالیکه بر روی باکتری‌های گرم منفی تاثیری ندارد. این پپتید ممکن است در سیستم ایمنی

ژل رویال مخلوطی از ترشحات غدد آرواره‌ای و شیری می‌باشد، که در رشد نوزادان، تکمیل صفات ویژه جنسی و زندگی طولانی ملکه نقش دارد. غدد غذاساز (غدد شیری) در زنبورعسل با تولید ژل رویال نقش مهمی در تکامل نوزادان کندو، به ویژه ملکه دارد. زنبورهای کارگر در سینه $۱۶-۶$ روزگی بیشترین فعالیت ترشحی ژل رویال را دارند و با افزایش سن و تغییر فعالیت آن‌ها ترشحات این غدد نیز تغییر می‌یابد. در سه روز اول دوره لاروی، تمامی لاروها با ژل رویال تغذیه می‌شوند و بعد از پایان سه روز نوع تغذیه آنها (کارگر و نر) تغییر می‌یابد در حالیکه لارو ملکه همیشه با ژل رویال تغذیه می‌شود [۱].

ژل رویال مورد استفاده برای تغذیه زنبورهای کارگر و نر با ژل رویال ملکه متفاوت می‌باشد (مقدار پروتئین ژل رویال نسبت به ژل کارگری کمتر می‌باشد) [۱].

ژل رویال ماده‌ای غلیظ و شیری رنگ با بوی تند و طعم

1- Royalisin






دستوئیک اسید به بدن در برابر کشتن ویروس‌ها کمک می‌کند و باعث تحریک تولید گلبول‌های سفید خون برای کشتن ویروس‌ها می‌شود [۱].

۳- کربوهیدراتها:

قندها سومین قسمت مهم از ترکیبات ژل رویال می‌باشند که از فروگتوز، گلوکز و سوکروز با مقدار جزئی از سایر قندها مانند گالاکتوز، مانیتول، مالتولوز، تورانوز، پالاتینوز، مالتوتريوز، مالتوز، تره هالوز، مليبیوز، رابینوز، ارلوز، جنتوییوز، ایزومالتوز، رافینوز، ملزیتوز و گلوکونیک اسید تشکیل شده است. کربوهیدراتهای موجود در ژل رویال در شکل ۱ آمده است [۴، ۵، ۱].



شکل ۱- غلظت کربوهیدرات‌ها در ژل رویال

- ویتامین‌ها: ویتامین‌ها در ژل رویال با یک طیفی گسترده‌ای توزیع شده‌اند. ژل رویال دارای مقدار جزئی ویتامین ث است، همچنین دارای انواع ویتامین‌های گروه ب می‌باشد که تیامین، ریوفلاوین، پیریدوکسین، پانتوتئینیک اسید به مقدار زیاد و نیاسین (B₃)، اسید فولیک (B₉)، بیوتین (B₈) به مقدار کمتر موجود است. مقدار آن‌ها در جدول ۱ آمده است [۱، ۶].

مواد معدنی:

مقدار خاکستر (مواد معدنی) حدود ۰/۸٪ تا ۳ درصد ژل رویال می‌باشد (براساس وزن تازه) [۸].

مواد معدنی عمده پتاسیم، فسفر، گوگرد، سدیم، کلسیم،

و دفاع زنبور عسل در برابر تهاجم باکتری‌ها نقش داشته باشد. رویالیسین به عنوان یک داروی آنتی بیوتیکی از ژل رویال استخراج شده و در مصارف پزشکی بکار می‌رود. این پیتید شامل ۱۶/۷٪ والین و ۱۸/۵٪ سرین می‌باشد.

آپی سیمین^۲: پیتید متشکل از ۵۴ اسید امینه به وزن ۵۵۴۰ دالتون است که باعث تحریک تکثیر مونوکیت‌ها در انسان می‌شود.

جلیسین^۳: شامل چهار پیتید آنتی میکروبیال است جلیسین ۱، ۲، ۳ و ۴. که این پیتیدها به طور انحصاری دارای فعالیت ضد میکروبی بر علیه مخمرها، باکتری‌های گرم مثبت و منفی می‌باشند [۲].

۲- لیپید: لیپید‌ها ۳-۱۹٪ وزن خشک ژل رویال را تشکیل می‌دهد. و دومین جزء مهم بعد از پروتئین‌ها به حساب می‌آیند [۱].

پروفیل چربی ژل رویال شامل:

۱۱/۳۰ میلی گرم بر دسی لیتر تری گلیسرید، ۶۲/۵ میلی گرم بر دسی لیتر کلسترول، ۲۸/۵ میلی گرم بر دسی لیتر HDL، ۱۱/۴ میلی گرم بر دسی لیتر LDL، ۲۲/۶ میلی گرم بر دسی لیتر VLDL است [۳].

اسید چرب‌های موجود در ژل رویال شامل:

ترانس-۱۰-هیدروکسی-۲-دستوئیک اسید، ۳-هیدروکسی دستوئیک اسید، ۱۱-اکسوسدستوئیک اسید و ۱۱-اس-هیدروکسی-۲-دستوئیک اسید می‌باشد. که در این بین اسید چرب اصلی ژل رویال ۱۰-هیدروکسی-۲-دستوئیک اسید می‌باشد که یک اسید اشباع نشده با ده کربن و زنجیر خطی است و بعنوان شاخصی برای ارزیابی ژل رویال خالص به شمار می‌رود. این ترکیب دارای اثرات فارماکولوژیکی از جمله خواص آنتی بیوتیکی و ضد سرطانی است، محققین آلمانی و فرانسوی متوجه شدند که ۱۰ هیدروکسی-۲- Apisimin 2- Jelleines 3-





گلوکونیک اسید (۰/۰۶ وزن تازه ژل رویال). بنزوئیک اسید (۸-۱۵ میلی گرم بر کیلو گرم). مقدار کمی مالیک، لاکتیک و سیتریک اسید نیز در ژل رویال یافت شده است [۱].

ترکیبات فنلی موجود در عسل، بره موم و ژل رویال در سه دسته فلاونول، فلاوانون و فلاونونها قرار می‌گیرند. از جمله ترکیبات فنولیکی در ژل رویال اسید فنولیک، اسید سینامیک کومارین، ایزو کومارین، نفتوكوئینون، گزانتون، آنتراکوئینون، فلاونوئیدها و لیگنین می‌باشد (جدول شماره ۲ [۹، ۱۰]). تفاوت در مقدار ترکیبات فنلی موجود در ژل رویال به فاکتورهایی از قبیل آب و هوای منبع گیاهی (گیاه مورد استفاده زنبور عسل)، فصل، فاکتورهای ژنتیکی، فاکتورهای محیطی از قبیل نوع خاک، سلامت گیاه بستگی دارد [۱۰، ۱۱].

جدول ۲- ترکیبات فلاونوئیدی موجود در عسل، بره موم و ژل رویال [۱۰]

گروه	ترکیبات
فلاونول ها	کوئرستین، کائمنفروл، گالانجین، فایستین
فلاوانون ها	پنوسمبرین، نارنجین، هسپریدین
فلاون ها	آپاجنین، آساستین، چرایسین، لوئنولین

فعالیت های بیولوژیکی ژل رویال:

بسیاری از فعالیت های بیولوژیکی ژل رویال در مدل های آزمایشی و حیوانات آزمایشگاهی (موش، موش صحرایی، خرگوش و همسرت) مورد بررسی قرار گرفته است.

۱- فعالیت آنتی اکسیدانی: فعالیت آنتی اکسیدانی ژل رویال از استرس اکسداتیو و پراکسیداسیون چربی ها جلوگیری می کند و همچنین محافظت DNA در برابر آسیب های اکسیداتیو است. مطالعاتی که در رابطه با اثرات ژل رویال در جیره موش ها انجام شد نشان داد که موش های تغذیه شده با جیره حاوی ژل رویال به مدت ۱۶ هفته سطح ۸-هیدروکسی-۲- دسنوئیک اسید (مارکر استرس اکسیداتیو)

آلومینیوم، منزیوم، روی، آهن، مس و منگنز و مواد معدنی جزئی (۰/۰۱-۱ میلی گرم در ۱۰۰ گرم) از نیکل، بیسموس، کروم، تالیوم، آنتیموان، تنگستن. مقدار سدیم بین ۱۱-۱۴ میلی گرم در هر ۱۰۰ گرم می باشد.

جدول ۱- مقدار ویتامین های موجود در ژل رویال [۷]	
ویتامین ها	مقدار (میلی گرم / ۱۰۰ گرم)
ویتامین	۱/۱۰
ویتامین	۰/۲
ویتامین	۵
ویتامین B1	۲/۰۶
ویتامین B	۲/۷۷
ویتامین B6	۱۱/۹۰
ویتامین B12	۰/۱۵
ویتامین B5	۵۲/۸۰
ویتامین (یاسین) PP	۴۲/۴۲
ویتامین C	۲
ویتامین (اسید فلیک) B9	۰/۴۰

۵- آنزیمهای: تعدادی از آنزیم ها که در ژل رویال وجود دارد: گلوکراکسیداز، اینورتاز، اسید و آلکالین فسفاتاز، آلفا و بتا استراز، لوسین آمینو پپتیداز، والین آمینو پپتیداز، لیپاز، فسفو آمیدازها و سوپرا کسید دیسموتاز می باشند.

دیگر ترکیبات جانبی:

ترکیبات متعددی در ژل رویال شناسایی شده اند که در این میان می توان به دو ماده هتروسیکلیک با نام های، بیوپترین و نئوپترین که مقدار آن ها ۲۵-۵۰ میکرو گرم بر گرم ژل رویال تازه می باشد اشاره نمود.

از جمله ترکیبات دیگر چندین نوکلتوتید (آدنوزین، یوریدین، گوانوزین، یوریدین و سیتیدین، آدنوزین مونو فسفات، آدنوزین دی فسفات و آدنوزین تری فسفات)، استیل کولین (۱ میلی گرم بر گرم وزن خشک ژل رویال و





لثوکونستوک^۷، استافیلوکوکوس^۸، استرپتوکوکوس^۹ می‌باشد[۵، ۱۳].

۶- اثرات ضد التهابی و التیام زخم: ژل رویال با کاهش اکسیداسیون و تشکیل کلاژن در بافت گرانوله شده باعث کوتاه شدن دوره التیام زخم و افزایش اثرات ضدالتهابی می‌شود. در مطالعات آزمایشگاهی صورت گرفته ژل رویال باعث بهبود تولید کلاژن از فیبروبلاست‌های پوست در حضور اسید آسکوربیک ۲-آلfa گلوکوسید(AA-2G) و افزایش تولید کلاژن بوسیله ۱۰-هیدروکسی ۲-دستوئیک اسید و ۱۰-هیدروکسی دکانوئیک اسید می‌شود[۱۳].

بیشترین نوع اسیدهای چرب موجود در ژل رویال شامل هیدروکسی اسیدها است که برای سیستم ایمنی ضروری است. همچنین دارای مقادیر بالایی از فسفولیپیدها است که برای عملکرد مغز لازم است. در بسیاری از تحقیقات مشخص شده است که ژل رویال برای بیماری‌های آلزایمر و پارکینسون مفید است. ژل رویال دارای مقادیر زیادی استیل کولین و گلوبولین است. گلوبولین‌ها در بهبود سیستم ایمنی نقش مهمی ایفا می‌کنند، همچنین ژل رویال غنی از ویتامین‌های ب کمپلکس است بطوریکه پانتوتئینیک اسید بیشترین مقدار را به خود اختصاص می‌دهد. این ویتامین در ساخت کورتیزون، ساخت steroidsin غدد آدرنال، متابولیسم استروژن و هورمون‌های تخدمان و ساخت ایمینو گلوبولین‌ها (پروتئین‌هایی که سلول‌های سفید خون را حفاظت می‌کند در برابر ویروس‌ها، باکتری‌ها و قارچ‌ها بسیار مهم است[۱۳]).

مصطفوی و کاربرد ژل رویال:

خاصیت ویژه ژل رویال در تغییر وضعیت یک نوزاد زنبور کارگر با عمر کم و فاقد خصوصیات جنسی، به یک زنبور ماده بالغ و کامل (ملکه) با استعداد زندگی ۱۰ تا ۲۰ برابر طول عمر زنبور کارگر مشخص می‌شود. همچنین ژل رویال

7- *leucostoc*

8- *stafilococcus*

9- *streptococcus*

بالاتری در کبد، سرم خون داشتند و متوسط طول عمر آنها افزایش یافته است[۱۲، ۱۳].

۲- فعالیت نوروتروفیکی: مصرف ژل رویال باعث بهبود حافظه، جلوگیری از پیری، افزایش انرژی، کاهش اضطراب و افزایش آرامش می‌شود. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد ترکیبات موجود در ژل رویال اثراتی بر روحی سلول‌های عصبی دارد. ژل رویال حاوی مقادیر زیادی استیل کولین است که نوروترانسミتری در هر دو سیستم عصبی مرکزی و محیطی می‌باشد. ۱- هیدورکسی ۲- دستوئیک موجود در ژل رویال باعث افزایش تولید نورون‌ها می‌شود و همچنین ژل رویال نقش نوروتروفیک و حفاظت از نورون‌ها در هیپوکامپوس موش‌های بالغ ایفا می‌کند[۱۳].

۳- کاهش دهنده فشار خون و فعالیت‌های تنظیمی خون: ژل رویال با تاثیر گذاشتن بر روحی سیستم قلبی-عروقی باعث تنظیم فشار خون می‌شود. ژل رویال می‌تواند جایگزین دارویی مناسبی برای افراد مبتلا به آنمی (کم خونی) باشد بطوریکه مصرف ۳-۲ هفته به طور معنی داری باعث بهبود تولید و کیفیت سلول‌های قرمز خونی می‌شود[۱۳].

۴- فعالیت‌های ضد سرطانی: مکانیسم فعالیت‌های ضد سرطانی ژل رویال به ۱۰-هیدروکسی ۲-دستوئیک اسید بر می‌گردد که دارای اثرات مهار کننده‌ی بر روحی (VEGF) است بنابراین مانع تکثیر و مهاجرت سلول‌ها می‌شود[۱۳].

۵- فعالیت آنتی بیوتیکی: بعد از زهر و بره موم، ژل رویال قوی‌ترین فعالیت آنتی باکتریال را در بین فراورده‌های زنبور عسل به خود اختصاص می‌دهد. پروتئین‌های ژل رویال دارای اثرات آنتی باکتریال برعلیه باکتری‌های گرم مثبت (لاکتوباسیلوس هلوتیکوس^{۱۰}، کلستریدیوم^{۱۱}، کورنو باکتریوم^{۱۲}) است بنابراین مانع

4- *Lactobacillus helveticus*

5- *Clostridium*

6- *Corynebacterium*





منابع

- 1- Shakespeare, K.H.V.(2012). The Royal Jelly Book.
- 2-Barnutiu,L.I.,L.AL.Marghitas.,D.Dezmirean.,C.M.Mihai.,O. Bobis.(2011). Chemical composition and antimicrobial activity of royal jelly-Review. Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies. 44(2): 67-72
- 3-Shinkhede, M.M. (2009). Royal Jelly Protein and Lipid Composition in Apis cerana indica F. International Journal of Industrial Entomology. 18(2): 139-142
- 4-Cotte, J.-F. (2004). Chromatographic analysis of sugars applied to the characterisation of monoflral honey. Analytical and bioanalytical chemistry. 380(4): 698-705
- 5-Fujiwara, S.(1990). A potent antibacterial protein in royal jelly. Purification and determination of the primary structure of royalisin. Journal of Biological Chemistry. 265(19): 11333-11337
- 6- Krell, R.(1996). Value-added products from beekeeping. Food & Agriculture Org.
- 7.Baltrusaityte, V., P.R. Venskutonis, and V. Čeksterytė. (2007). Radical scavenging activity of different floral origin honey and beebread phenolic extracts. Food Chemistry. 101(2): 502-514
- 8.Antinelli, J.-F.,S. Zeggane., R.Davico., C.Rognone., J.P. Faucon., L. Lizzani.(2003). Evaluation of 10-hydroxydec-2-enoic acid as a freshness parameter for royal jelly. Food Chemistry. 80(1): 85-89
- 9.Liu, J.-R., Y.C.Yang., Li.Sh.Shi.,Ch.Peng.(2008). Antioxidant properties of royal jelly associated with larval age and time of harvest. Journal of agricultural and food chemistry. 56(23): 11447-11452
- 10.Viuda-Martos, M.,Y.R.Navaras., F.Lopez and J.A.P.Alvarez.(2008). Functional properties of honey, propolis, and royal jelly. Journal of Food Science. 73(9): R117-R124
- 11.Perez-Perez, E., V. Patricia, and H. Fazlul.(2013). Flavonoids and polyphenols in studies of honey antioxidant activity. Int. J. Med. Plant Altern. Med. 1(4): 063-072
- 12.Inoue, S., Koya-Miyata, S., Ushio, S., Iwaki. K., Ikeda, M., Kurimoto, M.(2003). Royal jelly prolongs the life span of C3H/HeJ mice; correlation with reduced DNA damage, Exp. Gerontol. 38(9): 965-969
- 13.Pavel, C.I., L.Al.Marghias., O.Bobis., D.S.Dezmirean., A.Sapcaliu., I.Radoi., M.N.Madas.(2011). Biological Ac-

باعث ایجاد تغییرات مرفوولوژیکی و فیزیولوژیکی زیادی در زنبور ملکه می شود. بنابراین انسان سعی کرده است که از این غذای ویژه به خاطر برخی منافع آن استفاده کند. مصارف انسانی ژل رویال به صورت مکمل غذایی، ترکیب با فرآورده های غذایی، ترکیب در فرآورده های دارویی و شبیه دارویی و ترکیب در فرآورده های بهداشتی – آرایشی است. مصرف غذایی آن نیز برای افزایش قدرت بدن و اشتها ای افراد سودمند است و برای تحریک اسب های مسابقه کاربرد دارد.

موارد مصرف دارویی ژل رویال:

- بهبود سلامت عمومی
- جلوگیری از پیری زودرس و افسردگی
- تعدیل فشار خون (برای افراد دارای فشار بالا و پایین) به دلیل سرشار بودن از استیل کولین
- بهبود بیماری های آنفولانزا، رماتیسم، ورم مفاصل، زخم معده و روده و کم خونی
- کنترل سطح کلسترول و تصلب شرایین
- بهبود زگیل پوستی
- سوختگی های پوستی بیماریهای مزمن و علاج ناپذیر
- ایجاد مقاومت در برابر بیماری های ویروسی
- بهبود نوزادان زودرس
- تنظیم فعالیت غده های کلیوی
- تحریک متابولیسم بدن بدلیل فعالیت آنزیمی موجود در ژل رویال
- مصرف محلول ۵-۳۰ میلی گرم ژل رویال در هر لیتر آب مقطر به صورت تزریق در تاول های سوختگی، باعث بهبود مجدد رشد پوست می شود.
- مصارف ژل رویال در فرآورده های بهداشتی – آرایشی نیز باعث تعدیل چربی پوست، لطیف و زیبا شدن پوست و مو، رشد مجدد و تحریک لایه اپتیلیال پوست می شود و ضد چین و چروک پوست است [۱۴].





۱۴- بصیری، م. ر. (۱۳۸۷) فراوری محصولات زنبورعسل، انتشارات موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی، تهران.

tivities of Royal Jelly-Review. Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies. 44(2): 108-118.

Chemical and biological activity of royal jelly

Sadredini 1, A., Nehzati Paghale 2*. GH., F.Ghaziani 2.N

1. M.sc., student of University of Tehran

2. Assistant Professor, University of Tehran

Royal jelly is a milky and thick like substance that is a complex mixture of water, sugars, fats, proteins and free amino acids such as proline and lysine. A number of enzymes are also present including glucose oxidase, phosphatase and cholinesterase, biopterine, neopterine(coenzyme), 10-hydroxy-2-decanoic acid. Royal jelly has many function in the field of medical and medicine, nowadays it is produced as a commercial product.

Key words: Honey bee, Royal jelly, enzyme, protein, lipid

