



۳۶

## زنبور عسل و گرده افشاری محصول

خدیجه مدادی

گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

تاریخ دریافت: مرداد ۹۵      تاریخ پذیرش: آبان ۹۵

رایانامه: kh.madahi@yahoo.com



- (۲) موهای بدن چنگالی: این موها باعث جمع آوری بهتر گرده و انتقال آن به اطراف می شود.
- (۳) قطعات دهانی، کیسه عسل و شانه عسل این زنبورها برای ذخیره شهد و گرده تخصص یافته است.
- (۴) Corbiculae: سبد گرده در زنبورها پیچیده است. سبد های گرده موجود در پاهای عقبی زنبورهای کارگر باعث برگرداندن گرده به کلنی می شود.
- (۵) ساختار تمیز کننده شاخک ها: یک ساختار در پاهای جلویی است که به وسیله آن زنبور قادر به تمیز کردن شاخک ها است.
- (۶) ارتباط زنبور به زنبور: زنبورهای پیشاهنگ<sup>۱</sup> از طریق

### مقدمه

ارزش زنبورها به عنوان گرده افشار اولین بار توسط Apis (Koelreuter, 1761) کشف شد. زنبورهای عسل spp.). مهم ترین گرده افشارهای محصولات کشاورزی و با غی هستند. زنبورهای عسل سازگاری های زیادی دارند که آن ها رابه کارآمدترین گرده افشار ها تبدیل گرده است. برخی از مهم ترین سازگاری های آن ها به شرح زیر است:

(۱) واحد اجتماعی<sup>۲</sup>: از آن جا که کل افراد کلنی زنبور عسل زمستان گذرانی می کنند، در مقایسه با سایر زنبورها از جمله زنبورهای محملی که فقط ملکه زمستان گذرانی می کند، تعداد زیادی از زنبورها در اول بهار آماده تغذیه هستند.



۱-۴-وفاداری<sup>۳</sup>

حشره باید نسبت به گل‌ها ثبات داشته باشد یعنی باید در یک زمان مشخص، فعالیت آن محدود به شکوفه‌های یک‌گونه گیاهی باشد. حشراتی که به طور متناوب از یک گونه گیاهی به گونه دیگر منتقل می‌شوند، تلقیح کمتری را انجام می‌دهند. همچنین در صورت تخصصی بودن بیش از حد فعالیت حشره، کارایی آن محدودتر می‌شود.

۲-۴-تمامیت<sup>۴</sup>

زنبورها برای گرده افشاری باید در تماس با اندام‌های ضروری یعنی بساک پرچم‌ها و کلاله‌های مادگی قرار گیرند. در غیر این صورت قادر به انتقال گرده نخواهد بود. کارایی زنبورهایی که برای گرفتن شهد و گرده از گل‌ها بازدید می‌کنند، در مقایسه با زنبورهایی که فقط از شهد گیاهان استفاده می‌کنند بیشتر است.

## ۳-۴-ساعت‌کاری

زنبورهایی که فعالیت آن‌ها اوایل روز تا عصر ادامه دارد، از نظر کمی بیشتر کار می‌کنند. علاوه بر این، زنبورهایی که فعالیت آن‌ها در آب و هوای نامساعد مثل روزهای ابری و سرد به طور نسبی طولانی است، برای محصولاتی که در این شرایط شکوفه می‌دهند مفید خواهد بود.

## ۴-۴-جمعیت کل

حضور جمعیت بزرگی از حشرات گرده افshan در زمان شکوفه دهی محصول، مطلوب بوده و بازده تولید محصول به حداقل خود می‌رسد و تعداد حشرات موجود در واحد زمان به عنوان عامل محدود کننده عمل نمی‌کند.

۵-زنبورهای عسل به عنوان موثرترین گرده افshan ها همان طور که بیان شد در واریته های خودناسازگار، میوه و بذر بدون دگرگرده افشاری تولید نمی شود. علاوه بر این، در واریته های خودتلقیح نیز دگرگرده افشاری باعث افزایش کیفیت میوه ها و بذور می شود (Free, 1993). بررسی ها نشان داده اند که گرده افشاری زنبورهای عسل در سیب باعث افزایش تشکیل میوه، افزایش کیفیت میوه و کاهش ریزش میوه می شود (Dulta and Verma, 1987).

(*Apis mellifera* و *Apis cerana*) ارزش خاصی داشته و می توانند برای گرده افشاری مدیریت شوند. در حقیقت اهمیت اصلی زنبورداری، گرده افشاری زنبورها بوده و تولیدات

رقصدین یا سایر سامانه های تخصصی ارتباطی می‌توانند اطلاعات مربوط به یک محصول را به سایر زنبورها انتقال دهند.

(۷) قابلیت انتقال کلنی های زنبورها به محصولات نیازمند به گرده افشاری: در هر کلنی جمعیت های بزرگی از جستجوگرها وجود دارد که تنها روی یک نوع گل فعالیت می‌کنند (وفاداری به گل) و به این دلایل زنبورهای عسل عوامل گرده افshan مطلوب برای محصولات کشت شده به شمار می‌روند.

## ۳-مزایای گرده افشاری زنبور عسل

تولید مثل سوماتیکی و اثرات هتروزیس سازشی یا هیبرید، به عنوان نتیجه‌ای از دگرگرده افشاری زنبورها در نتاج گیاهان اتفاق می‌افتد، که باعث ایجاد تغییرات اقتصادی و بیولوژیکی کیفی و کمی در گیاهان، جوانه زنی دانه گرده روی کلاله‌ی گل، افزایش بقای جنین بذر و گیاه، افزایش تولید میوه‌های مقوی و معطر، افزایش توده گیاهی و تحریک رشد سریع تر گیاهان، افزایش تعداد و اندازه دانه و عملکرد محصولات، افزایش تشکیل میوه و کاهش ریزش میوه، افزایش تولید شهد در غده‌های شهدسازگل‌ها، افزایش مقاومت به بیماری‌ها و آفات و افزایش محتوی روغن دانه‌های روغنی می‌شود.

باد احتمالاً مهم ترین عامل گرده افشاری است و بیشتر درختان جنگلی و علف‌های هرز، به جز موارد خودگشتن توسط باد گرده افشاری می‌شوند. در این گیاهان تولید دانه گرده در گل‌های نر فراوان بوده و گل‌های ماده سطوح کلاله‌ی بزرگی برای دریافت دانه گرده دارند. ذرت مثال خوبی از محصولات گرده افشاری شده با باد است. گونه‌های زیادی از پرندگان از شهد و دانه گرده برخی از گل‌ها تعذیب کرده و به عنوان گرده افshan خدمت می‌کنند، اما گرده افشاری آن‌ها محدود به گیاهان وحشی و زینتی محدود است. حشرات، از جمله زنبورها، مگس‌ها، شب پره‌ها، پروانه‌ها، سوسک‌ها، تریپس‌ها و پشه‌های بیشتر گونه‌های گیاهی را گرده افشاری می‌کنند. زنبورها کارآمدترین گرده افshan هاستند، زیرا جمع آوری شهد و گرده توسط آن‌ها اصولی بوده و اختلالی در عملکرد گیاه ایجاد نمی‌کند. ۸۹ درصد از گرده افشاری حشرات، توسط زنبورها انجام می‌شود.

## ۴-زنبورهای عسل و گرده افشاری

کشاورزی نوین برای تامین نیازهای گرده افشاری خود تا حد زیادی به زنبورهای عسل وابسته است. این حشرات صلاحیت‌های ارزشمند متعددی برای ایفای این نقش دارند. جمعیت کلنی‌های زنبور عسل می‌توانند به راحتی افزایش یافته و با اقلیم‌های متعددی سازگار شده است. شرایط لازم برای گرده افشاری موثر به شرح زیر است:

3- Constancy

4- Thoroughness





و کیفیت دانه در کلم، گل کلم، تربچه، خردل برگ پهنه و کاهو Partap and Verma, 1992; 1994; Verma and Partap,) (1993; 1994)، بهبود بازده و کیفیت مارچوبه، هویج، پیاز، Deodikar and Suryanarayana, 1977; Woyke (1981)، افزایش تشکیل میوه و افزایش محتوی روغن در منداب و آفتابگردان (Singh et al., 2000) می شود. این نتایج اهمیت و نقش گرده افشنای زنبورها در افزایش بهره وری محصول و بهبود کیفیت میوه ها و دانه ها را تایید می کند (جدول های ۱ تا ۳). کیفیت گرده افشنای با تعداد کلی در واحد سطح، قدرت کلی ها، نحوه قرارگیری کلی ها در مزرعه، زمان قرار گیری کلی ها و شرایط آب و هوایی در ارتباط است.

کندو دومین ارزش را دارند. گزارش شده است که زنبورهای عسل نقش مهمی در افزایش سطوح بازدهی محصولات مختلف مثل میوه ها و دانه های آجیلی، سبزیجات، بقولات، دانه های روغنی و محصولات علوفه ای ایفا می کنند.

گرده افشنای زنبورها بازده و کیفیت محصول را در سیب (Dulta, Gupta et al., 1987) (and Verma, 1987)، هلو، آلو، مركبات، کیوی (Partap et al., 2000) و توت فرنگی (Partap et al., 2000) افزایش داد. گرده افشنای زنبور موجب تشکیل میوه و کاهش ریزش میوه در سیب، هلو، آلو و مركبات (Partap et al., 2000)، افزایش عصاره میوه و محتوی قند در مركبات (Partap, 2000)، کاهش درصد میوه های ناقص توت فرنگی (Partap, 2000)، کاهش تولید دانه

### جدول ۱- افزایش بازده محصول حاصل از گرده افشنای زنبورها

تعداد کلی های زنبور مورد نیاز در هر هکتار	درصد مورد انتظار افزایش در محصول ناشی از گرده افشنای	الزامات گرده افشنای	محصول
۵-۸	۲۰	بسیار دگرگشن	بادام
۲-۳	۲۰	بسیار دگرگشن	سیب
۲-۳	۲۰	غلب دگرگشن	مرکبات
۲-۳	۵	نیاز به انتقال گرده	نارگیل
۲-۳	۲۰	غلب دگرگشن	انگور
۲-۳	۱۰	دگرگشن	گواوا
۲-۳	۳	مواجه با زنبور مفید است	انبه
۲-۳	۱۰	نیاز به انتقال گرده	پاپایا
۳-۵	۲۰	بیشتر دگرگشن	خردل
۲-۳	۲۰	غلب دگرگشن	کنجد
۲-۴	۲۰	دگرگشن	آفتابگردان
۲-۶	۱۰	غلب دگرگشن	پنبه

۳۸

### جدول ۲- درصد افزایش بازده در برخی از محصولات بر اثر گرده افشنای زنبور

افزایش (%)	محصول			افزایش (%)	محصولات میوه ای
۲۲۲-۱۳	دانه های روغنی	۱۰۰-۳۰۰	سبزیجات	۶۹/۵۰-۱۸	سیب
	خردل	۲۲-۱۰۰	Cole crops	۷۵-۵۰	بادام
۱۱۴-۴	گلرنگ	۹-۱۳۵	تربچه	۱۰-۵	زردآلو
۳۴۰۰-۲۱	آفتابگردان	۱۰۰-۱۲۵	هویج	۱۰۰-۵۶	گیلاس
۴۰-۲۴	کنجد	۶۷۰۰-۲۱	شلم	۲۲۲-۷	مرکبات
۴۵-۱۷	نیجر	۹۸۷۸-۳۵۳	خیار و کدو	۵۴-۲۳	انگور
۴۹-۲	بذر کتان	۳۰۰-۱۰۰	پیاز	۳۰-۱۲	گواوا
	علوفه		کلم	۱۰۲۴۶-۴۵۴	لیچی
۱۹۷۳۳-۲۳	یونجه	۱۰۰-۶۳	محصولات متفرقه	۱۶۵۵-۵۳۶	آلو
۶۸۰۰-۱۹۳	شبدر پرسیم	۳۹-۱۷	گندم سیاه		
۳۳۱۵۰-۴۰	شبدر	۵۰-۲	قهوه		
۲۰۰۰-۳۹	ماشک	۹۰-۷	پنبه		
۱۰۰۰-۳	Birds foot		انواع لوبیا		





### جدول ۳- خلاصه مدیریت گرده افشاری محصولات مختلف

زمان مکان یابی کلنی ها	A. cerana تعداد کلنی های در هکتار	A. mellifera تعداد کلنی های در هکتار	دوره شکوفه دهی محصول	محصول
۱۰-۵٪ شکوفه	۱۲-۱۰	۸-۵	اواسط فوریه تا اواسط مارس	میوه ها
۱۰-۵٪ شکوفه	۱۲-۱۰	۸-۵	روزهای آبریل (۱۰-۷)	بادام
۱۰-۵٪ شکوفه	۶-۴	۳-۲	اواسط فوریه (۳-۶ هفته)	سبب
۱۵-۱۰٪ شکوفه	۱۲-۱۰	۸-۵	آبریل- می	زردالو
۱۰-۵٪ شکوفه	۶-۴	۳-۲	روزهای فوریه (۱۰-۷)	اوکادو
۱۰-۵٪ شکوفه	۵-۴	۳-۲	مارس- آبریل	گیلاس
۱۰-۵٪ شکوفه	۲۰-۱۶	۹-۸	مارس- آبریل	مرکبات
۱۰-۵٪ شکوفه	۶-۴	۳-۲	مارس- آبریل	کیوی
۱۰-۵٪ شکوفه	۶-۴	۳-۲	مارس- آبریل	لیچی
۱۰-۵٪ شکوفه	۳-۲	۲-۱	فوریه- مارس (۴-۳ هفته)	انه
۱۰-۵٪ شکوفه	۶-۴	۳-۲	مارس- آبریل (۲ هفته)	هلو
۱۰-۵٪ شکوفه	۶-۴	۳-۲	فوریه (۲-۱ هفته)	خرمالو
۱۰-۵٪ شکوفه	۲۵	>۱۵	فوریه- آبریل (۲ ماه)	آلوا
۱۵-۱۰٪ شکوفه	۱۰-۸	۵	فوریه- مارس	توت فرنگی
۱۵-۱۰٪ شکوفه	۱۲-۱۰	۸-۵	مارس- آبریل	سبزیجات
۱۵-۱۰٪ شکوفه	۱۰-۸	۵	مارس- آبریل	کلم
۱۵-۱۰٪ شکوفه	۱۶-۱۲، ۳-۲	۱ برای یک پایه، ۸ برای دوپایه	ژوئن- سپتامبر	هویج
۱۵-۱۰٪ شکوفه	۱۲-۱۰	۸-۵	ژوئن- سپتامبر	گل کلم
۱۵-۱۰٪ شکوفه	۳-۲	۲-۱	ژوئن- سپتامبر	خیار
۱۰-۵٪ شکوفه	۱۲-۱۰	۸-۵	ژوئن- سپتامبر	کدوها (کدو تبل، کدو مسما، کدو قلیابی)
۱۰-۵٪ شکوفه	۶-۴	۳-۲	اپریل	بامیه
۱۰-۵٪ شکوفه	۶-۴	۳-۲	مارس- آبریل	پیاز
۱۰-۵٪ شکوفه	۶-۴	۳-۲	مارس- آبریل	تریچه
۱۰-۵٪ شکوفه	۱۰-۸	۵	فوریه- مارس	شلغم
۱۵-۱۰٪ شکوفه	۸-۵	۵-۳	دسامبر- ژوئن، فوریه- مارس	محصولات دانه ای
۱۵-۱۰٪ شکوفه	۸-۶	۵-۳	آگوست- سپتامبر	خردل و کلزا
۱۰-۵٪ شکوفه	۶-۴	۵	مارس- آبریل	نیجر
۱۰-۵٪ شکوفه	۱۰-۸	۵	ژوئن	گلرنگ
۱۵-۱۰٪ شکوفه	۶-۴	۳-۲	مارس- آبریل	آفتابگردان
۱۵-۱۰٪ شکوفه	۶-۴	۳-۲	جوالی- سپتامبر	محصولات ادویه ای
۱۵-۱۰٪ شکوفه	۶-۴	۳-۲	فوریه- آبریل	هل
۱۵-۱۰٪ شکوفه	۶-۴	۳-۲	مارس- آبریل	فلفل
۱۵-۱۰٪ شکوفه	۶-۴	۳-۲	فوریه- آبریل	گشنیز

(Partap, 1999)

کاهش سرعت پرواز زنبور شده و سرعت باد بیشتر از ۲۵ متر بر ساعت، پرواز زنبور را به طور کامل متوقف می کند. بادهای گرم نیز باعث کاهش ترشح شهد و در نتیجه کاهش جذابیت گل می شوند. همچنین شرایط گرم و خشک باعث کاهش اقلیم مناسب برای جوانه زنی گرده می شود.

۷- عوامل موثر بر جمعیت های زنبور  
تعداد کلنی های زنبورهای عسل و تعداد زنبورهای موجود در هر کندو تحت تاثیر بیماری ها، اسپری آفت کش، مقدار کم شهد و تغییرات فصلی باشد. کاربرد آفت کش های با دامنه وسیع

- رفتار گرده افشاری زنبورهای عسل زنبورهای عسل موجودات خونسردی هستند که برای انجام فعالیت خود در خارج از کلنی، به دمای اطراف وابسته هستند. پروازهای زنبورها برای گرده افشاری در دامنه دمایی ۵۵-۵۵ درجه فارنهایت انجام می شود. در دمایهای کمتر از ۵۵ درجه، تعداد کمی از زنبورها به خارج از کندو پرواز کرده و این پرواز فقط به منظور تمیز کردن و پروازهای جهت یابی است. با افزایش دما، خروج زنبورها از کلنی به منظور یافتن آب برای پایین آوردن دمای کلنی است. بادهای شدید باعث





و گرده مورد نیاز و در نتیجه فعالیت جستجوگری زنبورها و به نوبه خود گرده افشاری بیشتر می شود.

#### ۱۱- مزایای اندازه گیری نشده گرده افشاری

در برخی از موارد از جمله تامین غذای حیات وحش، زیبایی طبیعی حاصل از گرده افشاری گل های وحشی، تخمین ارزش دلاری گرده افشاری زنبورها غیر ممکن است.

#### ۱۲- زنبورهای عسل به عنوان گرده افشاری

گونه های اهلی شده: دو گونه مهم وجود دارد. زنبور عسل اروپایی *Apis mellifera L.* که یک گونه بومی جهان قدیم به جز آسیای گرمسیری است و به بیشتر نقاط جهان جدید معرفی شده است. محدوده جستجوگری آن ۳ کیلومتر است. زنبور کندوی هندی *A. cerana indica F.* گونه بومی آسیای گرمسیری، که محدوده پرواز آن ۵/۱ کیلومتر است و به دلیل دوره جستجوگری طولانی تر و بسیاری از خصوصیات دیگر، در گرده افشاری بهتر از

(Sihag and Mishra, 1995).

گونه های وحشی: دو گونه دیگر شامل *A. dorsata* (زنبور سنگی/ زنبور درشت) و *A. florea* (زنبور کوچک) نیز بومی آسیای گرمسیری و از گرده افشاری های موثر هستند. اما این زنبورها قادر به زندگی در کندوهای مصنوعی نیستند. دامنه جستجوگری آن ها به ترتیب ۵/۲ تا ۴ و ۱ کیلومتر است. در گوجه فرنگی مقادیر گرده جمع آوری شده توسط زنبورهای عسل کم است و زنبورهای محملی عملکرد بهتری نسبت به زنبورهای عسل دارند (Houbaert and Jacobs, 1992).

#### ۱۳- مدیریت زنبورهای عسل برای گرده افشاری

زنبورها به دلیل ویژگی های مرغولوژیکی، رفتار اجتماعی و تکنیک های مدیریتی صورت گرفته، به عنوان مهم ترین و در اصل تنها گرده افشاری های محصولات هستند (Van Engelsdorp and Van Meixner, 2010). موارد زیر باید در نظر گرفته شود:

#### ۱۴- قدرت جستجوگری کلنی ها

به منظور به دست آوردن بیشترین مقدار عسل و بیشترین گرده افشاری، باید کلنی پر جمعیت بوده و تعداد نوزادان کلنی نسبت به زنبورهای جستجوگر کمتر باشد. (Matheson, 1986, 1991) پیشنهاد کرد که کلنی استفاده شده برای گرده افشاری، باید لاقل شامل هفت قاب با ۶۰٪ نوزاد (حداقل ۲۵٪ در مرحله تخم یا لارو) در اتاق ک نوزادی، یک ملکه بارور، حداقل ۱۲ قاب پوشیده شده با زنبور، شانه های خالی کافی، مقادیر کافی از گرده باشد.

#### ۱۵- الزامات گرده افشاری و تراکم کلنی ها

تعداد کلنی های پیشنهاد شده در هر هکتار، به نوع محصول و شرایط منطقه ای مانند تعداد زنبورهای عسل و سایر گرده

تعداد زیادی از کلنی ها را ضعیف یا منهدم می کند. خشکسالی یا بارندگی های طولانی مدت، دماهای پایین و یخبندان های زودهنگام تولید شهد توسط گیاهان را محدود می کنند.

#### ۱۶- دستکاری زنبورها برای گرده افشاری محصول

الف) اغلب تولیدکننده های میوه ها، سبزیجات یا بذور به اشتباہ فکر می کنند که «زنبورهای همسایه» می توانند به مقدار کافی محصول آن ها را گرده افشاری کنند، به همین دلیل در زمان برداشت با شکست مواجه می شوند. زیرا با وجود اینکه زنبورهای عسل می توانند ۵-۵ کیلومتر دور تراز کلنی پرواز می کنند، بیشترین کارایی گرده افشاری فقط در شعاع ۱۸۳-۲۷۴ متری کلنی اتفاق می افتد.

ب) با انتقال مستقیم زنبورها به مزرعه، می توان فعالیت پرواز را در آن منطقه افزایش داد. هرچه زنبورها به کلنی نزدیک تر باشند، کارآمدتر خواهند بود. در نتیجه برای دستیابی به بالاترین کارایی باید کلنی ها را در فواصل ۴۵۷-۲۷۴ متری توزیع کرد. زنبورهای بی تجربه نزدیک تر به کندو فعالیت می کنند، سپس با افزایش سن و تجربه، پراکنده می شوند. در صورت غیر جذاب بودن برخی از گیاهان یا واریته های خاصی از آن ها برای زنبورها می توان از روش اشباع سازی سطح با زنبورها استفاده کرد. هیچ گاه از اسپری های قندی و جلب-کننده ها برای افزایش جمعیت استفاده نکنید.

#### ۱۷- محافظت از زنبورها در برابر آفت کش ها

تنها روش ایمن برای محافظت از کلنی های زنبور عسل، انتقال آن ها از مکان اسپری شده است که در صورت زیاد بودن تعداد کندوهای انجام آن سخت یا غیر ممکن است. USDA (وزارت کشاورزی آمریکا) پیشنهاد می کند که در حین اسپری کردن حشره کش های کندوهای را با یک پارچه کیسه ای پوشانده و پارچه را خیس نگه دارید. البته موفقیت این روش در اوایل و در حد متوسط بوده است.

#### ۱۸- قدرت حداقل کلنی

هر کندو شامل یک ملکه تخمگذار، تعداد کمی زنبور نر و چند هزار زنبور کارگر است که زنبورهای کارگر مسئول گرده افشاری محصولات هستند. در ابتدای بهار تعداد زنبورهای کارگر یک کلنی ۱۰ تا ۲۰ هزار بوده، در صورتی که در تابستان جمعیت آن ها ۴۰ هزار تا ۶۰ هزار می رسد. در تابستان بخش پایینی کندو به نام محفظه نوزاد زنبور<sup>۵</sup> پر از تخم، لارو و شفیره شده (در کل نوزاد<sup>۶</sup> نامیده می شوند). هرچه بخش حاوی نوزادان بزرگتر باشد، شهد



5- brood chamber

6- brood





یکسان از یکدیگر است (جدول ۴). به طور کلی، تعداد کلنی ها در هکتار به عوامل متعددی مانند تراکم گل ها، جذابیت آن ها، حشرات و محصولات رقیب، گونه، مکان، درصد گل های باز شده در یک زمان وغیره بستگی دارد.

افشان های موجود، اندازه محصول و حضور محصولات رقیب مثل گونه های وحشی بستگی دارد. همچنین مکان قرارگیری کلنی ها در پراکنش زنبورها روی محصولات تاثیرگذار است. به طور کلی، تعداد توصیه شده، ۳-۵ کلنی در هکتار با فاصله

#### جدول ۴- نیازگرده افشاری محصولات مختلف

نیازگرده افشاری تعداد کلنی در هکتار	محصول	نیازگرده افشاری تعداد کلنی در هکتار	محصول	نیازگرده افشاری تعداد کلنی در هکتار	محصول
۸-۲	پیاز	۵-۳	خردل	۳-۲	سیب
۶-۳	یونجه (Lucerne)	۲-۱	کدو تنبیل	۸-۵	بادام
۶-۲	پنبه	۳-۲	کنجد	۳-۲	مرکبات
۳-۲	پاپایا	۳-۲	گووا	۴-۲	آفتتابگردان
۳-۲	انگور	۲۰-۶	خیار	۵-۲	تریچه
۵	Sprouting Brussels	۷/۵-۳/۵	ماش گل خوش‌ای	۳-۲	نارگیل
۵-۱	Musk melon	۶	هویج	۵-۳	گل کلم
۱-۰/۲	شبدر سفید	۵-۲	گیلاس	۳-۲	انبه
۸	کیوی	۵-۲	مرکبات	۵-۱	هندوانه
۴-۳	شبدر بر سیم	۶-۴	گلابی	۳	گندم سیاه

(Sale, 1983)

۴۱

۶-۱۳- جایگزینی یا چرخش در هنگام جستجوگری کلنی ها خارج از محصول هدف، باید کلنی ها را با کلنی های تازه جایگزین کرد.

۷-۱۳- جایگذاری موقتی به طور کلی، گل ها، گرده/ شهد خود را در زمان های خاصی از روز فراهم می کنند، در نتیجه محدود کردن زنبورها درون کندویشان، تا زمان آماده شدن گرده/ شهد محصول هدف، باعث حفظ موقتی زنبورها در یک محصول می شود.

۸-۱۳- حذف رقابت گلدهی علف های اسایر محصولات غیر هدف باید حذف شوند یا در زمان گلدهی چیده شوند، تا از ایجاد رقابت در زنبورهای جستجوگر جلوگیری شود.

۹-۱۳- گرده دان ها<sup>۷</sup> گرده دان ها (تعییه کننده ی گرده<sup>۸</sup>) گرده را برای زنبورهایی که کندورا ترک کرده اند، فراهم می کند، بدین صورت که این زنبورها می توانند در صورت کمبود واریته های در دسترس گرده افشار، دگرگرده افشاری انجام دهند. این حالت می تواند بدون نیاز به حضور تعداد زیادی زنبور روی محصول هدف، باعث افزایش

۱۳-۳- کارایی جستجوگری کلنی ها و فاصله آن ها از محصول زنبورهای عسل قادر به جستجو فواصل قابل توجه کندوها هستند، اما کارایی آن ها به طور غیر مستقیم به فاصله ی تحت پوشش آن ها بستگی دارد. به طور کلی دامنه جستجوگری *Apis dorsata* ۱/۵ کیلومتر، *A. cerana* ۲/۵ کیلومتر، *A. mellifera* ۳ کیلومتر و *A. florea* ۱ کیلومتر است. بازده محصولات در صورت حضور کلنی ها در فاصله ۱/۵ کیلومتری از آن ها افزایش یافته و در فاصله ۱ کیلومتری، بازده به بیشتر از نصف کاهش می یابد. به طور کلی قرارگیری کندوها در شعاع ۱/۵ کیلومتری باعث افزایش گرده افشاری محصول می شود.

۴-۱۳- انتقال کلنی ها به محصولات انتقال کلنی ها و کاهش مدت زمان مهاجرت زنبورها منجر به کاهش خطرات مهاجرت در مسافت های طولانی و کاهش مرگ نوزادان و افزایش کارایی جستجوگری می شود. همچنین باید توجه داشت که کلنی ها در جهت ها و فاصله های مختلف به طور نامنظم مرتب شوند ..

۵-۱۳- زمان انتقال کلنی ها به محصولات زمان انتقال کلنی ها به محصولات نیازمند به گرده افشاری زمانی است که این محصولات به اندازه کافی گلدهی گرده باشند و حدود ۵ تا ۱۰ درصد شکوفه روی گیاهان وجود داشته باشند. روش عملی، انتقال چند کلنی در ابتدای دوره گل دهی محصول و انتقال بقیه کلنی ها پس از شکوفه دهی گل های بیشتر است

7- Pollen dispensers

8- pollen insert





می توان با تامین موادغذایی مکمل مثل شربت شکر / یا مکمل گرده در اول فصل، رشد کلنی را تحریک و سرعت آن را افزایش داد.

#### ۳-۱۴- تعداد شان

واحد استاندارد استفاده شده توسط زنبورداران، کندوی لانگستروت (Langstroth-deep-hive body) است، که در صورت داشتن ۱۰ قاب، ۲۷۰۰ اینچ مربع شان فراهم می شود. در نتیجه یک کلنی گرده افشنایی به یک یا بیش از یک کندوی استاندارد نیاز دارد.

#### ۴-۱۴- تعداد نوزادان

یک کلنی سالم زنبور عسل در طول فصل جستجوگری حاوی تخم، لارو و شفیره است. نوزادان به طور غیر مستقیم بر کارایی گرده افشنایی یک کلنی تاثیر می گذارند. لاروهای غذا، به خصوص گرده افشنایی یک کلنی تاثیر می گذارند. بین تعداد نوزادان در یک کلنی و میزان گرده آورده شده به کندو توسط زنبورهای جستجوگر رابطه مستقیم وجود دارد.

#### ۵-۱۴- تعداد زنبورها

زنبورهای مسن تر در یک کلنی مسئول گرده افشنایی هستند. بررسی ها نشان داده است که یک شان استاندارد، ۴۰۰ زنبور بالغ را در خود جا می دهد. در نتیجه تعداد کل بالغ ها در یک کلنی با حداقل استاندارد می تواند حدود ۶ قاب کامل پوشیده شده یا ۱۴۴۰۰ و ۲۴۰۰۰ بالغ در ۱۰ قاب باشد.

#### ۶-۱۴- نیاز غذایی

کلنی های زنبور عسل برای رشد معمول خود، به شهد و گرده نیاز دارند. نیاز غذایی یک کندو از دو طریق به دست می آید، از فعالیت های روزانه زنبورهای جستجوگر و از طریق غذای ذخیره شده در شان ها.

۱۵- چالش های موجود در گرده افشنایی مدیریت شده محصول زنبورهای عسل به مراتب مهم ترین عوامل دگرگرده افشنایی هستند. زنبورهای عسل به جز مزایای مستقیم یعنی عسل و موم، مزایای غیر مستقیم مانند افزایش عملکرد برخی از محصولات کشاورزی و محصولات جنگلی به دلیل خدمات گرده افشنایی دارند. ارزش ریالی افزایش بازده، در مقایسه با ارزش تولید عسل و موم، ۲۰ برابر یا حتی بیشتر است. در محصولاتی با دگرگرده افشنایی بالا مثل بادام، شبدر، برخی و رایته های سیب و خربزه، بهترین عملکرد با گرده افشنایی حشرات مشاهده می شود. برخی از محصولات برای تولید بذر / میوه به طور انحصاری به زنبورها وابسته هستند (جدول ۶).

کارایی گرده افشنایی زنبورها شود.

۱۰-۱۳- واحدهای گرده افشنایی قابل عرضه (DPU's<sup>۹</sup>) واحدهای گرده افشنایی قابل عرضه، کلنی های کوچک بدون شان هستند که با اتمام گلدهی نابود شده یا می میرند.

#### ۱۱-۱۳- آرایش کلنی ها

به منظور اطمینان از توزیع یکنواخت زنبورهای جستجوگر، آرایش کلنی ها در محصول بسیار مهم است که به گونه گیاه، مقدار شهد و گرده ای در دسترس در واحد سطح، شرایط آب و هوایی و ویژگی های فیزیکی منطقه مانند شیب توپوگرافی، جهت باد، سرپناه و غیره بستگی دارد. قرار دادن کلنی ها در وسط محصول باعث افزایش سطح جستجوگری می شود (Free, 1993). کلنی ها در گروه های کوچک ۴-۵ تایی در فاصله های حدود ۲۰۰ متری در بین محصول نگهداری می شوند. کلنی ها در زمستان در جهت خورشید و در تابستان و فصول بارانی در زیر سرپناه نگهداری می شوند. در شرایط سرد و طوفانی از بادشکن ها استفاده می شود (Kumar et al., 1998).

#### ۱۴- ارزیابی کلنی های زنبور عسل برای گرده افشنایی

زنبور عسل های به عنوان گرده افشنایی ضروری توصیف شده اند. دلیل موفقیت زنبورهای عسل به عنوان گرده افشنایی، به برخی از جنبه های زیست شناسی آن ها برمی گردد. زنبورهای عسل برای تامین شهد و گرده دامنه وسیعی از محصولات را گرده افشنایی می کنند که این محصولات از نظر ما اهمیت دارند. دلیل دوم این وفاداری یا ثبات زنبورهای جستجوگر نسبت به گل های یک گونه گیاهی است. سومین دلیل موفقیت زنبورهای عسل قابلی انتقال آسان کلنی ها است. مهم ترین سوال در مورد گرده افشنایی زنبورهای عسل، تعداد کلنی مورد نیاز برای گرده افشنایی محصول است؟ پاسخ دادن به این سوال مشکل است، زیرا نیازمندی های مطلق گرده افشنایی برای بیشتر گونه های گیاهی مهم مشخص نشده است. به علاوه زمان های شکوفه دهی، تراکم، جذابیت، ساختار و رقابت شکوفه ها و آب و هوا نقش مهمی در تعیین کیفیت جستجوگری زنبورهای عسل و در نتیجه گرده افشنایی محصول ایفامی کنند.

#### ۱۴-۱- اندازه و کارایی کلنی

در یک کلنی، زنبورهای کارگر مسن به عنوان زنبورهای جستجوگر هستند. به عنوان یک قانون کلی، تعداد زنبورهای جستجوگر در کلنی های کوچکتر، کمتر و در کلنی های بزرگتر، بیشتر است..

#### ۱۴-۲- مدیریت کلنی ها

۴۲





## جدول ۵-محصولات وابسته به زنبورها برای گرده افشاری

نام محصول	دسته بندی محصولات/میوه ها
کدو تنبل، خیار، کدوی ریج، کدوی بطری، هویج، تربچه، کلم، کلم قمری، گل کلم، پیاز، سویا شلغم، خردل، آفتابگردان، نیجر، کنجد، گلرنگ، تخم بزرگ تور، urad، ماش، لوپیا، گواه، نخود، لوپیا چشم بلبلی یونجه، شبدر برسیم، شبدر پرتقال، گلابی، سیب، خلو، آلو، بادام، گیلاس، خرمalo، توت فرنگی، گواوا، انار، جمبیو، انجیر، کرین بری، انگور، لیمو، تمشک، توت سیاه گندم سیاه، پنبه، قهوه، تنباقو، شبدر شیرین، درخت تون، شیشم، stain، گیلاس وحشی، soapnut، تمشک وحشی، shain، جنس Euretia، جنس Robina، جنس Azadirachta، افرا، شاه بلوط، اکالیپتوس، بید، linden، کاتالپا، مانگولیا وغیره شبدر، جنس Eupatorium	سبزی ها دانه های روغنی بقولات لگوم های علوفه ای میوه ها سایر محصولات گیاهان مهم جنگل

از رقابت بین محصولات در جلب زنبورها، حذف علف ها، کوددهی مناسب، آبیاری و سایر عادات های کشت برای رشد سالم محصول، استفاده از حشره کش هایی با سمیت کم یا استفاده کم تراز حشره کش ها و مواد شیمیایی سمی مشابه، نقش کشاورزان را در گرده افشاری محصول نشان می دهد. زنبورداری به همان اندازه که هنر است، یک تکنیک نیز می باشد که به تحریبه عملی چند ساله نیاز دارد. زنبورداری علاوه بر این که به عنوان یک صنعت روزتایی در تولید عسل و موم به شمار می رود، می تواند فرصت های شغلی رانیز فراهم کرده و باعث افزایش بازده اقتصادی کشاورزان از طریق افزایش بهره وری مزرعه، حفظ کیفیت محیطی و پایداری کشاورزی متعادل شود.

۱۷- مدیریت گرده افشاری محصولات توسط زنبورها گروه های زنبور عسل زیر می توانند به منظور گرده افشاری محصولات مدیریت شوند:

الف) زنبورهای عسل: دو گونه زنبور عسل مدیریت شده برای اهداف گرده افشاری عبارتند از: *A. mellifera* و *A. cerana*. گونه های زنبور عسل می توانند به دلایل زیر برای گرده افشاری محصولات به کار برده شوند:  
(۱) زنبورهای عسل برای تامین گرده و شهد برای تغذیه خود، به گل ها وابسته هستند (Free, 1993).

(۲) زنبورها برای حمل و انتقال گرده و سازگاری های مرغولوژیکی دارند (Free, 1993).

(۳) زنبورهای عسل می توانند در کندوها نگهداری شوند و مدیریت آن ها بسیار آسان است (Dadant and Singh, 1960; Dadant and Sons, 1992).

(۴) زنبورهای عسل به دلیل طبیعت پلی لکتیک خود از

۱۶- مدیریت در حین گرده افشاری  
ممکن است نیاز محصولات به کلنی های زنبور عسل برای گرده افشاری متفاوت باشد. تعداد زنبورهای مورد نیاز به تعداد گل ها، گونه محصول، روش کشت، سن محصول، مرحله و مدت زمان گلدهی، اکوتایپ زنبورها، مدیریت کلنی، رقابت گونه های گل ها، تعداد گرده افشارهای وحشی و شرایط آب و هوایی بستگی دارد. به طور کلی، برای یک هکتار محصول، ۹-۱۰ گلنی زنبور مورد نیاز است. زیاد بودن تعداد کلنی، به گرده افشاری کمک می کند، اما ممکن است برای تولید عسل یا تکثیر کلنی نامناسب باشند، در نتیجه، باید تعداد کلنی های استفاده شده در هر هکتار بهینه باشد. کارایی گرده افشاری تا حد زیادی به مدیریت کلنی ها بستگی دارد. مهم ترین مسئله در مدیریت کلنی ها، حفظ کلنی ها در اوج فعالیت جستجوگری یعنی در زمان اوج فعالیت پرورش نوزادان است.

برخی از روش های مدیریتی کمکی عبارتند از: (۱) فراهم کردن شانه های تمیز و جدید برای تامین فضای کافی برای پرورش ثابت نوزادان، (۲) روش های پیشگیرانه علیه بیماری ها یا آفات، (۳) استفاده از یک ملکه جوان و قوی تازه جفت گیری کرده، استفاده از غذای مصنوعی رقیق (یک قسمت شکر در ۲ یا ۳ قسمت آب) در جمع آوری گرده توسط زنبورها مفید است. البته نباید از شربت غلیظ استفاده کرد.

برای مرتب بودن بازدید کلنی ها از گیاهان، بهتر است انتقال کلنی ها به مزرعه در زمان شروع گلدهی محصول باشد. اغلب همزمانی باز شدن گل ها و فعالیت زنبورها حائز اهمیت است. تغذیه کلنی ها با شربت قند، به همراه چند تا گل تازه و مقداری از گرده محصول، منجر به افزایش بازدید زنبورها از محصول می شود. الگوی کشت برنامه ریزی شده برای اجتناب





- Jay, 1986; Mardan, (1995). به آسانی به مکانی دیگر منتقل شوند (Sihag, 1990a,b). تعداد زیادی از گیاهان بازدید می کنند در نتیجه می توانند طیف وسیعی از محصولات را گردید افسانی کنند (Free, 1993; Sihag, 1995a).
- برای به دست آوردن محصول باید نکات زیر را در نظر گرفت:
- (۱) زمان قرار دادن کلنی های زنبور عسل: در زمان آغاز تا ۱۰٪ گلدهی، کلنی های زنبور عسل را روی محصول قرار دهید.
  - (۲) محل قرار دادن کلنی های زنبور عسل: کلنی ها در نزدیکی محصول قرار داده می شوند، به طوری که بتوانند به صورت فعالانه حرکت کرده و دگرگرده افسانی انجام دهنده و انرژی کمتری را در سفر صرف کنند.
  - (۳) روش قرار دادن کلنی های زنبور عسل: کلنی ها به صورت گروهی یا پراکنده قرار داده می شوند، به علاوه اینکه با توجه به راحتی زنبوردار، کلنی ها پیرامون محصول هدف یا به طور پراکنده بین محصول گذاشته می شوند.
- (۴) فراوانی آن ها روی محصول می تواند به راحتی دستکاری شود (Jay, 1986).
- (۵) زنبورهای عسل سیستم ارتباطی خوبی برای جستجوی و جمع آوری غذادراند، که به عنوان ثبات یا وفاداری به گل نامیده می شود (Wells and Wells, 1983; Waser, 1986) که این حالت برای گونه های گیاهی بسیار مهم است.
- (۶) زنبورهای غذادراند، که به عنوان ثبات یا وفاداری به گل نامیده می شود (Wells and Wells, 1983; Waser, 1986) که این حالت برای گونه های گیاهی بسیار مهم است.
- (۷) می توان از طریق تغییر سیستم پاداش گیاه/ یا منبع شهد و گرده موجود در کندو (Free 1965a, b, c, 1967; Baker,) یا نوزادان پوشش داده نشده در کلنی (Free, 1967; Cale, 1968) رفتار زنبورهای عسل را دستکاری کرد.
- (۸) کلنی های زنبورهای عسل می توانند برای تامین گرده

#### منبع ها:

- Al-Tikrity WS, Benton AW, Hillman RC, Clarke WW Jr. The relationship between the amount of unsealed brood in honeybee colonies; and their pollen collection. *J Apic Res* 1972; 11:9-12.
- Baker RJ. The influence of food inside the hive on pollen collective by a honeybee colony. *J Apic Res* 1971; 10:23-26.
- Cale GH. Pollen gathering relationship to honey collection and egg laying in honeybees. *Am Bee J* 1968; 108: 8-9.
- Dadant and Sons. In: Dadant CP, editor. *The hive and the honeybee*. Dadant and sons, Hamilton Deodikar GB, Suryanarayana MC. Crop yields and bee pollination. *Indian Bee J* 1972; 34:53-64.
- Deodikar GB, Suryanarayana MC. Pollination in the service of increasing farm production in India. *Adv Pollen-Spore Res* 1977; 2: 60-82.
- Dulta PC, Verma LR. Role of insect pollinators on yield and quality of apple fruit. *Indian J Hort* 1987; 44: 274-279.
- Free JB. The effect on pollen collecting of feeding honeybee colonies with sugar syrup. *J Agric Sci Camb* 1965a; 64: 467-468.
- Free JB. The behaviour of honeybee foragers when their colonies are fed with sugar syrup. *J Apic Res* 1965b; 4: 85-88.
- Free JB. The ability of bumblebees and honeybees to pollinate red clover. *J Appl Ecol* 1965c; 2: 289-294.
- Free JB. Factors determining the collection of pollen by honeybee foragers. *Anim Behav* 1967; 15: 134-144.
- Free JB. Insect pollination of crops, 2nd ed. London: Academic; 1993.
- Gupta JK, Rana BS, Sharma HK. Pollination of kiwifruit in Himachal Pradesh. In: Matsuka M, Verma LR, Wongsiri S, Shrestha KK, Uma Partap, editors. *Asian bees and beekeeping: progress of research and development*. Proceedings of the fourth international conference, 23-28 Mar 1998, New Delhi: Kathmandu. Oxford and IBH Publishing Co Pvt Ltd; 2000. P. 274.
- Houbaert D, Jacobs FJ. Accelerated fruit setting of tomatoes by insect pollination. In: Bees for pollination. Proceedings of an EC workshop, Brussels; 2-3 Mar 1992. p. 207-218.
- Jay SC. Spatial management of honeybees on crops. *Ann Rev Ent* 1986; 31: 49-65.





- Koelreuter JG. vorlaufige nachricht von einigen das geschlecht der pflanzen betreffenden versuchen und beobachten. Engelmann, Leipzig; 1761.
- Kumar J, Mishra RC, Thakur SS. Use of honeybees for increasing agricultural yields. In: Mishra RC, Rajesh G, editors. Perspectives in Indian apiculture. Bikaner: Agro Botanica; 1998.
- Mardan M. Varied pollinators for sub-tropical Asian crops. In: Roubik DW (ed) Pollination of cultivated plants in the tropics. Rome: FAO (UN); 1995.
- Matheson AG. Colony standards for Kiwifruit pollination. N Z Beekeep 1986; 189: 20-22.
- Matheson AG. Managing honeybee pollination of Kiwifruit (*Actinidia deliciosa*) in New Zealand - a review. Acta Hort 1991; 288: 213-219.
- Partap U. Pollination management of mountain crops through beekeeping. Kathmandu, Nepal: Trainers' resource book. ICIMOD; 1999.
- Partap U. Foraging behaviour of *Apis cerana* on citrus (*Citrus sinensis* var. Red Junar) and its impact on fruit production. In: Matsuka M, Verma LR, Wongsiri S, Shrestha KK, Uma Partap, editors. Asian bees and beekeeping: progress of research and development. Proceedings of the fourth AAA international conference, Kathmandu, 23-28 Mar 1998. New Delhi: Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd.; 2000. p. 274.
- Partap U, Verma LR. Floral biology and foraging behaviour of *Apis cerana* on lettuce crop and its impact on seed production. Progress Hortic 1992; 24: 42-47.
- Partap U, Verma LR. Pollination of radish by *Apis cerana*. J Apic Res 1994; 33: 237-241.
- Partap U, Shukla AN, Verma LR. Impact of *Apis cerana* pollination on fruit quality and yield in peach and plum in the Kathmandu valley of Nepal. In: Matsuka M, Verma LR, Wongsiri S, Shrestha KK, Uma Partap, Editors. Asian bees and beekeeping: progress of research and development. Proceedings of the fourth AAA international conference, Kathmandu; 2000. p. 23-28 .
- Sale PR. Kiwifruit culture. Wellington, New Zealand: Government Printing Office; 1983.
- Sihag RC. Behaviour and ecology of the sub-tropical carpenter bee, *Xylocopa fenestrata* F.1. Adaptive response to high temperatures Indian Bee J 1990a; 52(1-4), 36-37.
- Sihag RC. Behaviour and ecology of the sub-tropical carpenter bee. *Xylocopa fenestrata* F.2 Host plant association Indian Bee J 1990b, 52(1-4), 38-40.
- Sihag RC, Mishra RC. Crop pollination and *Apis cerana*. In: Kevan PG, editor. The asiatic hive bee: apiculture, biology and role in sustainable development in tropical and sub-tropical Asia. Canada: Enviroquest Ltd., Cambridge; 1995. P. 135-142.
- Singh LB. The mango. London: Leonard Hill; 1960.
- Singh B, Gatoria GS, Singh L. Effect of priming the queen cell cups on mass queen rearing in *Apis mellifera* Linn. Colonies. Indian Bee J 2000; 63(3): 68-71.
- vanEngelsdorp D, Meixner MD. A historical review of managed honeybee populations in Europe and the United States and the factors that may affect them. J Invertebr Pathol 2010; 103: S80-S95.
- Verma LR, Partap U. The Asian hive bee, *Apis cerana*, as a pollinator in vegetable seed production. Kathmandu: ICIMOD; 1993.
- Verma LR, Partap U. Foraging behaviour of *Apis cerana* on cabbage and cauliflower and its impact on seed production. J Apic Res 1994; 33: 231-236.
- Waser NM. Flower constancy: definition cause and measurement. Am Nat 1986; 127(5): 593-903.
- Wells H, Wells PH. Honey bee foraging ecology: optimal diet, minimal uncertainty or individual constancy? J Animal Eco 1983; 52:829-836.
- Woyke HW. Some aspects of the role of the honeybee in onion seed production in Poland. Acta Hort 1981; 111:91-98.

